

Acide Hyaluronique

Indications

Comblement des sillons, des rides et ridules ; redessiner les lèvres, les épaissir ; redessiner les contours du visage, restaurer les pertes de volumes.

Propriétés de l'acide hyaluronique

Il s'agit d'un produit utilisé depuis de nombreuses années, connu et sûr. Sa durée d'efficacité est d'environ 8 à 24 mois selon la réticulation du produit. Il s'agit d'un gel clair, stérile, transparent, entièrement biodégradable et qui ne nécessite pas de test de tolérance.

Avant le traitement

Il est recommandé d'éviter une consommation d'AINS, de dérivés de l'Aspirine ou autres anti-coagulants dans les 10 jours précédant les injections. La Vitamine E est également à proscrire. Il est recommandé de ne pas boire d'alcool ni de s'exposer au soleil la veille et le jour de la séance.

Déroulement du traitement

L'acide hyaluronique est injecté dans la peau en profondeur dans les compartiments sous-cutanés avec une très fine aiguille et une canule. Le gel injecté provoque un volume naturel souple et naturel au toucher. Ce traitement peut être réalisé sous crème anesthésiante sur la zone à traiter. Le produit injecté contient un anesthésiant rendant le traitement confortable.

Après le traitement

Immédiatement après le traitement, une hypersensibilité, un gonflement avec œdème sont ressentis aux sites d'injections. De petits hématomes sont également possibles, ainsi que de rares infections. Exceptionnellement, des granulomes peuvent apparaître quelques jours à quelques semaines après l'injection, ils régressent spontanément ou après traitement adapté.

Effets secondaires

Des complications rarissimes ont été décrites dans la littérature, à savoir des rougeurs persistantes avec des abcès, des nécroses cutanées, une cécité ou des granulomes à distance. Des infections au site d'injection sont rares. En cas de réaction inhabituelle, d'effets secondaires ou d'anomalies, même à distance de l'injection, nous vous prions d'en informer directement au plus vite votre médecin.

Contre-indications

Grossesse, allaitement et les personnes allergiques à l'acide hyaluronique. Une infection par le virus herpès est également une contre-indication transitoire, nécessitant de déplacer l'intervention.