

Laser Vasculaire

Indications

Couperose, rougeurs du visage, rosacée, varicosités des membres inférieurs.

Avant le traitement

Pour un résultat optimal, il est recommandé de réduire l'exposition solaire le mois qui précède l'intervention. Lors de chaque séance, merci de mentionner toute nouvelle prise de médicament et éviter de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des dérivés de l'acide salicylique (anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires) 7 jours avant le traitement. Il est important d'informer le médecin de l'apparition d'une nouvelle maladie et de poussée d'herpès.

Pendant le traitement

Le traitement se fait sans anesthésie locale, sur une peau parfaitement démaquillée et nettoyée, en portant des lunettes de protection appropriées. Le tir laser provoque une sensation de « lâcher d'élastique » accompagnée d'un bref échauffement, réduit par application d'une sonde réfrigérée. La durée du traitement est en fonction de l'étendue de la zone à traiter.

Suites du traitement

Des rougeurs avec sensations d'échauffement sont ressenties pendant 24 heures, parfois un gonflement sous les yeux (œdème) pendant 2-4 jours. Si l'atteinte est importante, le traitement sera plus intense, avec en conséquent l'apparition d'un purpura (coloration de la peau violacée, hématome) qui disparaît au bout de 7-10 jours.

Soins après traitement

Il n'y a pas d'éviction sociale à prévoir. Une adaptation individuelle est à considérer selon l'activité professionnelle. Une photo-protection solaire est recommandée pendant 1 mois avec crème solaire ipf 50, les rougeurs peuvent être maquillées.

Effets indésirables

Les brûlures superficielles, les cicatrices résiduelles et une décoloration sont rares. En cas de formation de brûlures superficielles, merci de ne pas frotter ni gratter. Il est alors recommandé d'appliquer des pommades antiseptiques, cicatrisantes.

Résultats

Les résultats sont appréciables après environ 4-8 semaines, un traitement nécessite environ 2-3 séances espacées de 1-2 mois.